

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Биологически активная добавка к пище

ИНФОЛЕКС

Состав:

Активные вещества:

Мио-Инозитол.....1000 мг

Мелатонин.....1 мг

Фолиевая кислота

((6S)-5-Метилтетрагидрофолиевая кислота)150 мкг

Список ингредиентов: мио-инозит, мелатонин, фолиевая кислота ((6S) -5-метилтетрагидрофолиевая кислота), микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния.

СВОЙСТВА

Мио-Инозитол (Miyoinositol): Мио-инозитол также снижает инсулинорезистентность, оказывает положительное влияние на профилактику и улучшение гестационного диабета. Он дает хорошие результаты при метаболическом синдроме, регулирует кровяное давление, нормализует уровень холестерина и триглицеридов. Было замечено, что он способствует снижению веса за счет расщепления жировых отложений. Повышает уровень хорошего холестерина и снижает уровень плохого холестерина. Это полезно для профилактики болезни Альцгеймера. Это повышает уровень триглицеридов в крови. Предупреждает образование репродуктивных проблем.

Мелатонин (Melatonin): Мелатонин — это гормон, который ваш мозг вырабатывает в темноте. Это помогает определить время ваших циркадных ритмов (24-часовые внутренние часы) и сон. Ночное воздействие света может блокировать выработку мелатонина. Добавки мелатонина могут помочь при определенных состояниях, таких как нарушение биоритма, нарушение фазы сна и бодрствования, некоторые нарушения сна у детей и беспокойство до и после операции.

Фолиевая кислота (Folic acid): витамин B9, также называемый фолиевой кислотой является синтетическим водорастворимым витамином. Ваше тело не может вырабатывать фолиевую кислоту, поэтому его необходимо получать с пищей. Добавки фолиевой кислоты предотвращают врожденные дефекты, особенно дефекты нервной трубки у женщин.

Показания для применения.

Продукт рекомендует как БАД при нижеследующих состояниях:

- Длительное умственное и эмоциональное перенапряжение
- Нарушение сна, стрессе и беспокойстве
- После приема антибиотиков и сульфаниламидов для восстановления концентрации инозитола
- Недостаток цельных зерен в рационе питания
- Нехватка в организме кальция, цинка, магния, железа
- В комплексной терапии для улучшения репродуктивной функции для мужчин и женщин
- Улучшение репродуктивной функции мужчин с бесплодием
- Поликистоз яичников с характерными симптомами и установленным фактом бесплодия
- Метаболический синдром, способствующий развитию сахарного диабета, который стал причиной снижения репродуктивной способности организма
- Нарушение овуляции, нерегулярный менструальный цикл
- Улучшение качество и количество спермы у мужчин
- Дисбаланс женских половых гормонов, отвечающих за зачатые и сохранение беременности

- Контроль за гиперстимуляцией яичников
- Для подготовки яйцеклеток перед проведением процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения)
- Снижение риска развития гестационного диабета
- Снижение избыточной секреции андрогенов
- Для улучшения внешнего вида кожи и волос
- Для общего укрепления организма

Противопоказания:

Гиперчувствительность к компонентам препарата

Беременность и период лактации:

Перед приемом препарата при беременности или ввремя лактации рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозировка:

Рекомендуется принимать взрослым по одной жевательной таблетки в день во время приема пищи.

Рекомендуемая суточная доза содержит:

Мио-инозитол 1000мг – 200% от рекомендуемого уровня суточного потребления;

Фолиевая кислота 100 мкг – 50% от рекомендуемого уровня суточного потребления;

Мелотонин 1 мг – 50% от рекомендуемого уровня суточного потребления;

Продолжительность приема 1 месяц.

Для лечения бесплодия или нормализации овуляции Инфолекс назначают курсу на три или шесть месяцев.

Увеличивается и доза приема: По 2 жевательные таблетки утром и вечером. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. При необходимости курс применения можно повторит. Определение суточной дозы и продолжительности приема препарата Инфолекс может производиться врачом индивидуально и отличаться от рекомендуемой дозы в данной инструкции.

Предупреждения:

БАД не является лекарственным средством!

Проконсультируйтесь с специалистом, если вы беременны, больны или кормите грудью. Не превышайте рекомендуемую дозировку.

Форма выпуска:

По 10 таблеток в блистере из алюминиевой фольги.

По 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Храните препарат в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года

Произведено для:

MAXX-PHARM.LTD

Лондон, Великобритания

Производитель:

Farmabest ilac. / Ankara Turkey

Company Registration Number: TR-06-K-061865