

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активная добавка к пище
НЕФРОДЕЛ/NEFRODEL

Состав:

Активные вещества:

Золототысячника травы.....	20 мг
Любистока лекарственного корней.....	22 мг
Розмарина листьев.....	25 мг

Вспомогательные вещества:

Микрокристаллическая целлюлоза.....	220 мг
Цитрат натрия.....	5 мг
Гуммиарабик.....	20 мг

Список ингредиентов: экстракт травы золототысячника, экстракт корня любистока лекарственного, экстракт листьев розмарина, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния.

СВОЙСТВА

Экстракт золототысячник травы (Centaury Herb extract): Одна из классических «горьких трав», обильно произрастающая в дикой природе. Он имеет долгую историю традиционного использования в качестве тонизирующего средства для пищеварения, а также использовался для лечения лихорадки - отсюда и название «лихорадка зверобой». Для пациентов с высокой температурой полезны препараты от *Erythraea Centaurium*. Как трава, он может стимулировать чувство голода и улучшить пищеварение, увеличивая образование желудочного секрета. Экстракт золототысячника обладает мягким противовоспалительным и антимуtagenным действием.

Экстракт любистока лекарственного корней (Lovage officinalis root extract): Любисток используется в качестве «ирригационной терапии» при боли и отеках (воспалении) нижних мочевыводящих путей, для предотвращения образования камней в почках и для увеличения оттока мочи при инфекциях мочевыводящих путей или задержке жидкости.

Экстракт розмарина листьев (Rosemary leaves extract): Розмарин является богатым источником антиоксидантов и противовоспалительных соединений, которые, как считается, помогают укрепить иммунную систему и улучшить кровообращение. Розмарин используется для улучшения памяти, расстройства желудка (диспепсии), боли в суставах, связанной с артритом, выпадения волос и других состояний.

Показания для применения.

В качестве биологически активной добавки при нижеследующих состояниях:
в качестве дополнительного средства в составе специфической терапии пиелонефрита, гломерулонефрита, интерстициального нефрита, а также профилактика образования мочевых камней и после операционного удаления мочевых камней.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, не разжевывая, запивая водой.
Взрослым - по 2 таб. 3 раза/день, детям школьного возраста - по 1 таб. 3 раза/день. После ослабления остроты заболевания следует продолжить прием в течение 2–4 недель. Во время приёма продукта рекомендуется потребление большого количества жидкости.

Побочные действия:

Аллергические реакции на компоненты препарата (например, сыпь, зуд). Желудочно-кишечные расстройства (например тошнота, рвота, диарея). При первых признаках аллергической реакции необходимо прекратить прием препарата.

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к любым компонентам препарата, к другим растениям семейства зонтичных (Umbelliferae) (например, анис, фенхель) или к анетолу (компонент эфирных масел).
- язва желудка и двенадцатиперстной кишки в острый период
- детский возраст до 6 лет
- отеки вследствие нарушения функции сердца или почек и/или если ограниченное потребление жидкости было рекомендовано врачом.

Особые указания:**БАД не является лекарственным средством!**

При продолжительной высокой температуре, спазмах, наличии крови в моче, нарушениях мочеиспускания и острой задержке мочи необходимо немедленно проконсультироваться с врачом. Нефродел содержит глюкозу, сахарозу и лактозу. Пациенты с наследственной непереносимостью фруктозы, галактозы, дефицитом лактазы или недостаточностью сахаразы-изомальтозы или мальабсорбцией глюкозы/галактозы не должны применять данный препарат.

Беременность и лактация:

Нефродел следует принимать во время беременности только по назначению врача, после оценки врачом соотношения пользы-риска от его применения и строго следуя указаниям по его применению. Продукт не следует принимать женщинам в период грудного вскармливания.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось. Лечение симптоматическое.

Форма выпуска и упаковка:

По 20 таблеток, покрытых оболочкой, в блистер из фольги алюминиевой и пленки ПВХ/ПВДХ. По 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года.

Произведено для:

MAXX-PHARM.LTD

Лондон, Великобритания

Производитель:

Farmabest ilac. / Ankara Turkey Company Registration Number: TR-06-K-061865